

چکیده:

(این پژوهش به ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مدیریت در مراکز بهداشت کرج و شهریار از نظر بهداشت مادر و کودک پرداخته است. بررسی در سه بعد: مراقبت‌های دوران بارداری، تنظیم خانواده و واکسیناسیون کودکان زیر یکسال، انجام گرفته است)

جمعاً ۶۰۴ مادر (۳۰۴ نفر در کرج و ۳۰۰ نفر در شهریار) که در طول سال ۱۳۷۶ زایمان کرده‌اند و علی‌زاده شرایط تنظیم خانواده (۲۹۸ نفر در کرج، ۲۸۸ نفر در شهریار) و ۶۰۳ کودک (۲۹۸ نفر در کرج و ۳۰۵ نفر در شهریار) که در زمان مطالعه ۱۲-۲۴ ماهه بودند مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

خلاصه‌ای از نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته‌ها بشرح زیر می‌باشد:

- میانگین سن حاملگی در زمان اولین مراقبت در دو شهرستان کرج و شهریار به ترتیب ۴ ماهگی و ۳/۹ ماهگی بود. با انجام تست کای دو (Chi-square) اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد ($P = .۳۷۰$).
- ۲۷/۶ درصد از مادران مورد مطالعه در کرج و ۲۳/۷ درصد در شهریار در گروه زنان در معرض خطر قرار داشتند که ۵۲/۳ درصد از آنها در کرج و ۶۰/۴ درصد در شهریار تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفته بودند.
- ۹۸ درصد از زایمانها در کرج و ۹۶ درصد در شهریار منجر به تولد زنده شده بود.
- ۹۷ درصد زایمانها در کرج و ۹۶ درصد در شهریار در بیمارستان انجام گرفته بود.
- میانگین دفعات مراقبت در دوران بارداری در کرج ۶/۹ و در شهریار ۶/۶ بار بود که اختلافی از این حیث وجود نداشت ($P = .۲۵۰$).

- ۸۹ درصد زنان واجد شرایط تنظیم خانواده مورد مطالعه در کرج و $\frac{82}{3}$ درصد در

شهریار از روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده می‌کردند.

- ۶ درصد از زنان واجد شرایط در کرج و $\frac{14}{3}$ درصد در شهریار از روش منقطع

استفاده می‌کردند و ۵ درصد از زنان در کرج و $\frac{3}{4}$ درصد در شهریار از هیچ روشی استفاده

نمی‌کردند.

- از نظر میزان پوشش واکسیناسیون در کرج و شهریار در میان کودکان مورد مطالعه

در مورد واکسن‌های ثلاث ۱، پولیو ۱، هپاتیت ۱ و ب.ث.ژ اختلافی در دو شهرستان وجود

نداشت.

- میزان پوشش ثلاث ۲ و ۳، پولیو ۲ و ۳، هپاتیت ۲ و ۳ و سرخک اختلاف

معنی‌دار در دو شهرستان وجود داشت و میزان پوشش و همچنین میزان کودکانی که بموضع

واکسینه شده‌اند (زیر یکسال) در تمامی موارد فوق در شهرستان کرج بیشتر بود.