

چکیده:

مقدمه: تجویز منطقی دارو به عنوان یک موضوع مهم از طرف سازمان بهداشت جهانی مطرح است چراکه مصرف غیرمنطقی دارو می‌تواند باعث کاهش احتمال موفقیت در روند درمان، افزایش عوارض جانبی احتمالی، کاهش پذیرش داروها از طرف بیمار و نیز تحمیل هزینه‌های سنگین به بیمار و اقتصاد یک کشور شود.

روش: در این تحقیق توصیفی تحلیلی، تعداد ۳۳۳۹ نسخه از نسخ پزشکان شبکه‌ی بهداشت و درمان ری در دو منطقه روستایی و غیر روستایی با استفاده از شاخص‌های ارزیابی تجویز منطقی داروی سازمان بهداشت جهانی در بهار سال ۱۳۹۷ مورد ارزیابی قرار گرفته است.

یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین تعداد اقلام دارویی ۳/۲۳ قلم دارو در هر نسخه و همچنین شاخص تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها ۴۹ درصد، کورتون‌ها ۲۱ درصد، داروهای تزریقی ۲۷ درصد و داروهای مسکن ۳۶ درصد بوده است. به علاوه نتایج تحلیل واریانس نشان داده است که تفاوت معناداری بین شاخص‌ها در نسخه‌های تجویزی پزشکان خانواده و سایر پزشکان شاغل در شبکه بهداشت و درمان ری وجود دارد (در مورد تجویز کورتون، مسکن و داروی تزریقی $p\text{-value} < 0.001$ و در مورد آنتی بیوتیک $P\text{-value} = 0.001$).

نتیجه‌گیری: شاخص‌های نسخه‌نویسی پزشکان با معیارهای جهانی فاصله داشته و ضروری است علاوه بر افزایش کیفیت و کمیت برنامه‌های آموزشی با اعمال مدیریت کارآمد و نظارت مداوم بر الگوی تجویز پزشکان شاخص‌های تجویز منطقی دارو به صورت مستمر پایش و کنترل شود.

کلید واژه: تجویز منطقی دارو، سازمان جهانی بهداشت، شاخص‌های نسخه‌نویسی